

# 病虫情报

第五期

平江县植保植检站

2025 年 7 月 4 日

## 切实抓好第二代二化螟和晚稻秧田 病虫害防治工作

发生情况:

二化螟: 三市测报灯下 6 月 27 日出现第一次二化螟发蛾小高峰达到 78 头, 但从 7 月 1 日、7 月 2 日、7 月 3 日蛾量分别是 113 头、190 头、218 头, 蛾量持续上升, 预计我县第二次二化螟发蛾高峰在 7 月 10 日左右。

稻纵卷叶螟: 受前段时间连续降雨影响, 6 月 23 日灯下始见蛾子, 但总体蛾量不多, 最多 4 头。

稻飞虱: 田间发生不整齐, 一季稻田平均百蔸虫 100-200 头, 最高的百蔸虫在 500 头以上。

纹枯病: 一季稻田平均病蔸率 3-8%, 7 月 3 日我站田间调查, 病蔸率 7.85%, 病株率 2.54%。

稻瘟病: 我县在安定镇止马村、三市镇渡头村、三墩乡戴市村、

伍市镇栗山村等乡镇村早稻发生稻瘟病，发病品种主要是中安2号、中早39号、中早77号、湘早籼45号等常规品种。当前我县部分再生稻即将进入破口抽穗期，在气候条件适宜的情况下，极易引起穗颈瘟发生，各地需切实抓好稻瘟病的监测工作，积极做好预防工作。

针对以上发生情况，特提出如下建议：

防治时间：第一次用药时间7月8日-7月14日

第二次用药时间7月20日-7月25日

防治对象：重点防治二化螟兼治稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻秆潜蝇、纹枯病等，预防稻瘟病。特别中稻与一季晚稻重点关注白背飞虱发生情况，防止南方黑条矮缩病发生。

防治对象田：再生稻、一季稻、一季晚稻、晚稻秧田。

防治药剂：

1. 防治二化螟（稻纵卷叶螟、稻秆潜蝇）：选用甲维茚虫威、5%阿维菌素、5.7%甲维盐、阿维·甲氧虫酰肼加20%氯虫苯甲酰胺等。
2. 防治稻飞虱：选用20%三氟苯嘧啶、80%烯啶·吡蚜酮、50%吡蚜酮。
3. 防治纹枯病：选用30%苯甲·丙环唑、己唑醇等。
4. 防治稻瘟病：选用9%吡唑醚菌酯、75%三环唑、32.5%苯甲·嘧菌酯、富士一号等。

注意事项：避免高温时段喷药，田间保持浅水层，注意农药品种轮换使用。

**公益提示:**

- 1、融合推进统防统治和绿色防控，助力化学农药减量增效，促进农业绿色发展。
- 2、科学合理轮换农药，注意农药使用安全间隔期，延缓病虫害抗药性产生。
- 3、严格实施植物检疫，守好农业生物灾害防控第一关。