

加义农技

加义农技站编印

(第7期)

2024年8月5日

切实抓好中晚稻病虫防治，警防重大病虫害暴发成灾

根据县植保站病虫情报，结合我地田间调查，稻纵卷叶螟预计8月11日左右进入低龄幼虫高峰；二代二化螟发育不整齐，预计8月下旬将出现三代二化螟卵孵盛期；稻飞虱、纹枯病在一季稻上进入垂直上升为害期，晚稻上进入流行始期；稻瘟病在易感品种和老病区发生叶瘟；一季稻处于孕穗阶段，8月下旬如遇连续阴雨天气，稻曲病流行风险高。据此，特提出如下防治意见：

一、防治时间与对象：

第一次防治时间：8月10~15日。

一季稻、早插晚稻：主治稻纵卷叶螟、稻飞虱、纹枯病，挑治钻心虫，兼治稻瘟病、稻曲病等；在防治适期内提倡破口前3~5天或齐穗后施药。

第二次防治时间：8月28~9月3日。

迟熟一季稻、晚稻：达到病虫防治指标的丘块立即补治，重点是钻心虫、稻纵卷叶螟和稻飞虱，预防稻瘟病、纹枯病和稻曲病等。

各农户应加强田间调查，根据田间虫情、苗情适当调整防治时间。

二、防治药剂：

二化螟、稻纵卷叶螟：选用猛去、神武大炮、优福宽、甲维·虫螨腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐等药剂。

稻飞虱：选用沙勇、扫火、高鉴、狂角刹等药剂。

纹枯病、稻曲病：选用拿敌稳、金灿、井蜡芽等。

预防稻瘟病：选用拿敌稳、金灿、吡唑醚菌酯、75%三环唑可湿性粉剂等药剂。

三、注意事项：

- 施药时轮换用药，田间保持3~5厘米水层，自然落干。
- 避免在高温时段施药，确保用药安全。
- 喷雾时加入助剂，提高农药利用率。
- 防治后及时检查防效，防效差的及时补治。

测土配方施肥建议卡

序号	总养分含量%	配合式(N-P2O5-K2O)作物	适宜作物	序号	总养分含量%	配合式(N-P2O5-K2O)作物	适宜作物
1	10	20-8-12	早稻	6	45	24-9-12	晚稻
2	40	21-7-12	中稻	7	40	18-12-10	玉米
3	40	22-6-12	晚稻	8	10	16-12-12	稻油区
4	45	23-10-12	早稻	9	40	17-12-11	茶叶
5	45	20-10-15	中稻	10	40	18-12-10	早稻
		20-10-13		11	52	26-10-16	一季稻

